

# 10

# Señales de Peligro de la Inmunodeficiencia Primaria

La inmunodeficiencia primaria (Primary Immunodeficiency, PI) hace que los niños y los adultos tengan infecciones que reaparecen con frecuencia y que son inusualmente difíciles de curar. 1:500 personas están afectadas por una de las inmunodeficiencias primarias conocidas.

**Si usted o alguien a quien usted conoce está afectado por dos o más de las siguientes señales de peligro, hable con un médico acerca de la posible presencia de la inmunodeficiencia primaria subyacente.**



**1** Cuatro o más infecciones de oídos nuevas en un año.



**2** Dos o más infecciones de senos paranasales graves en un año.



**3** Dos meses o más de tratamiento con antibióticos con escaso efecto.



**4** Dos neumonías o más en un año.



**5** Dificultad de un bebé o niño pequeño para aumentar de peso y crecer normalmente.



**6** Abscesos en órganos o abscesos cutáneos profundos recurrentes.



**7** Aftas persistentes en la boca o infecciones micóticas en la piel.



**8** Necesidad de recibir antibióticos intravenosos para eliminar las infecciones.



**9** Dos infecciones profundas o más, incluida la septicemia.



**10** Antecedentes familiares de PI.

Presentado como servicio público por:



Jeffrey Modell Foundation | Curing PI. Worldwide.



El financiamiento fue posible en parte gracias al subsidio 5H75DP225146-05 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de Estados Unidos.



National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)



National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)



**Baxter**  
BioScience

**CSL Behring**  
Biotherapies for Life™

**GRIFOLS**

**octapharma**

**PPTA**  
Plasma Protein Therapeutics Association

**Talecris**  
BIOPHARMACEUTICALS

Estas señales de peligro fueron presentadas por el Comité de Asesoramiento Médico de la Fundación Jeffrey Modell. Se recomienda enfáticamente la consulta a especialistas de inmunodeficiencia primaria.

Para obtener más información o remisiones, comuníquese con la Fundación Jeffrey Modell. 866-INFO-4-PI | [info4pi.org](http://info4pi.org)

Estos signos de alarma fueron elaborados por el Comité Asesor Médico de la Fundación Jeffrey Modell Foundation. Se recomienda vivamente la consulta con un experto en inmunodeficiencias primarias. ©2013 Jeffrey Modell Foundation

