


Protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la infancia (modificado de AEPNAA)

	SIGNOS Y SINTOMAS	TRATAMIENTO	
1		Picor en boca, leve sarpullido alrededor de la boca o labios, boca hinchada	•Antihistamínico Oral (pauta según edad)
2		Urticaria, ronchas, sarpullidos, picor o hinchazón de extremidades u otra zona del cuerpo	•Antihistamínico Oral • Corticoide Oral (pauta según edad)
3		Náuseas, dolor abdominal, diarreas, vómitos	•Antihistamínico Oral • Corticoide Oral (pauta según edad)
4		Picor de ojos, ojos rojos, lagrimeo, picor nasal, estornudos de repetición, moqueo abundante	•Antihistamínico Oral • Corticoide Oral (pauta según edad)
5		Garganta cerrada, ronquera, tos repetitiva, lengua/párpados/labios/orejas hinchadas	•Adrenalina IM (0.15/0.3) •Salbutamol Inhalado •Antihistamínico Oral • Corticoide Oral (pauta según edad)
6		Respiración entrecortada, tos repetitiva, tos seca, agotamiento, labios o piel azulada	•Adrenalina IM (0.15/0.3) •Salbutamol Inhalado •Antihistamínico Oral • Corticoide Oral (pauta según edad)
7		Pulso débil, presión arterial baja, desvanecimiento, palidez, labios o piel azulada.	•Adrenalina IM (0.15/0.3) •Antihistamínico Oral •corticoide Oral (pauta según edad) Mantenerlos tumbados con los pies en alto.

Administrar adrenalina precozmente si la reacción progresa rápidamente

Después de administrar adrenalina, llevar al niño a un centro sanitario ó llamar al 112 y decir anafilaxia.

- ✓ Cuando los síntomas son graves, primero tratar y después avisar al 112.
- ✓ Confirmar medicación y dosis con su enfermera y alergólogo de referencia.